VACUNACIÓN FRENTE A **TÉTANOS** EN EL ADULTO

DEBIDO A LOS ÚLTIMAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DE VACUNACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Y PARA UNIFICAR LOS CRITERIOS QUE SE VIENEN UTILIZANDO PARA LA VACUNACIÓN ANTITETÁNICA EN EL MEDIO LABORAL, A CONTINUACIÓN SE INDICAN LAS PAUTAS Y CRITERIOS DE LA OMS APLICADOS AL MUNDO LABORAL.

Aprovecho la oportunidad que me ofrece la revista " BIP " para conseguir llegar a una importante cantidad de compañeros que trabajan diariamente con accidentes laborales e intentar evitar la gran cantidad de dosis de vacunación, que son innecesarias, y que hasta ahora se han ido aplicando a los trabajadores que acuden a un servicio médico.

Indicaciones

- Todas las personas que no hayan recibido una primovacunación completa o por haber transcurrido más de 10 años de la última dosis.

Tipo de vacuna

- Preferiblemente vacunar con vacuna tétanos - difteria de adulto, evitando vacunar solo del tétanos.

Pautas

- Adultos nunca vacunados: Iniciar primovacunación con 3 dosis, (0 - 1 a 3 meses y 6 a 12 meses).
- Adultos correctamente vacunados que acuden por una herida:
- Herida limpia:
- Si hace menos de 10 años de la última dosis: No vacunar.
- Si hace más de 10 años: Poner dosis de recuerdo.
- Herida potencialmente tetagénica:
- Poner dosis de recuerdo si hace más de 5 años de la última dosis.
- Adultos que acuden para vacunarse y que han recibido alguna dosis de recuerdo:
- Si hace más de 10 años: poner dosis de recuerdo, NO REINICIAR LA VACUNACION.
- Si hace menos de 10 años, no es necesario vacunar.
- Adultos que han recibido parcialmente las dosis de Primovacunación: Hay que continuar con la pauta. Por ejemplo: trabajador que se le puso la 1ª dosis de tétanos y que han pasado más de 3 meses, se le pone la 2ª dosis y al año la 3ª dosis. O que ha recibido las 2 primeras dosis y ha pasado más de 1 año, se le pone la 3ª dosis y se le vacunaría de nuevo a los 10 años. NO REINICIAR LA VACUNACION.

Vias de Administración

- La vía de administración será intramuscular profunda, en región Deltoidea. Nunca en Glúteo. (se ha demostrado que la grasa del glúteo mayor dificulta la absorción de la vacuna).
- Como vía alternativa utilizaremos la región anteroexterna del muslo (vasto externo).

Contraindicaciones

- Anafilaxia
- Alergia algún componente.

- Reacciones adversas en dosis previas.

- NO esta contraindicado en:
- Inmunodeprimidos.
- Embarazadas.

>> Dr. D. José Luis Herráez Cortés
Jefe de Servicio Médico
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.